A meningococcus szerocsoportjainak eloszlása Ausztriában a 2014. és 2021. közötti időszakban, átlagosan



- A meningococcusnak különböző szerocsoportjai léteznek. Ausztriában a B csoport okozza a legtöbb megbetegedést, de az A, C, W és Y csoporttal való fertőzés is okozhat súlyos betegséget.

A meningococcus okozta megbetegedések egynegyede a gyermekek első életévében fordul elő. Ebből jól látható, hogy miért kiemelkedően fontos, hogy a csecsemők a lehető leghamarabb megkapják a védőoltást.

Különböző vakcinák léteznek, amelyek a meningococcus különböző csoportjai ellen nyújtanak védelmet:

- A meningococcus B elleni védőoltás alkalmazása minden gyermek és serdülő számára a lehető legkorábban ajánlott; az oltást már a 2. hónapot betöltött babák is felvehetik – az emlékeztető oltások pedig 25 éves korig adhatók.
- A meningococcus A, C, W és Y csoportjai elleni kombinált védőoltás a csecsemők számára a lehető legkorábban, a 13. hónaptól ajánlott. 10 éves kortól 13 éves korig szerepel a gyermekek ingyenes országos védőoltási programjában, hiszen ebben a korban kezdődik a betegség második csúcsa. Felzárkóztató oltásként is ajánlott 25 éves korig.

A meningococcus okozta betegség elleni lehető legjobb védelemmel kapcsolatban kérdezze meg orvosát!

Ez a brosúra több nyelven tölthető le.

Deutsch	German
Türkçe	Turkish
українська	Ukrainian
Magyar	Hungarian
Српски	Serbian
عربي	Arabic

facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz

instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz

MENINGOKOKKEN JA ZUM SCHUTZ

www.meningokokken-erkrankung.at

GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Wienerbergstraße 7, 5. Stock
1100 Wien, Österreich

NP-AT-MNU-BROC-250003 04/2025

GSK

A MENINGOCOCCUS ÁLTAL OKOZOTT BETEGSÉGEK

LÉPJEN MOST. LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS.

A védőoltás védelmet nyújthat a meningococcus okozta megbetegedés ellen!

A következő cégek támogatásával: ÖÄK Österreichische Ärztekammer; ÖGKJ Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

Mi a meningococcus okozta betegség?

A meningococcus okozta betegség egy életveszélyes bakteriális fertőzés, amely különösen drámai lefolyású is lehet. A meningococcusok elsősorban agyhártyagyulladást (meningitist) vagy vérmérgezést (szepszist) okoznak.

A baktérium az ember orrgaratában található meg; a fertőzés csókolózással, köhögéssel vagy tüsszentéssel terjed.

A lakosság körülbelül 10%-a hordozza tünetmentesen a meningococcust, a baktérium azonban ekkor is képes másokat megfertőzni.

Ritka esetekben a meningococcus megtámadja a szervezetet és invazív betegséget okoz. A fejletlen immunrendszerük miatt a csecsemők esetében nagyobb a meningococcus okozta betegség kockázata.

A meningococcus okozta betegség
ritka, de életveszélyes betegség

Az 1 év alatti csecsemők különösen veszélyeztetettek. A csecsemők és serdülőkorú gyermekek egyaránt nagyobb kockázatnak lehetnek kitéve.

A meningococcus okozta betegség
elsőre nehezen diagnosztizálható

A meningococcus okozta betegséget azonnal intenzív ellátással kell kezelni, mivel gyorsan életveszélyessé válhat. Sajnos az első tüneteket gyakran túl későn veszik észre, mivel azok az influenzára hasonlítanak.

Gyakori tünetei

Gyakori tünetek csecsemők esetén: harsány sírás, feszes vagy kidudorodó kutacs, merev vagy petyhüdt test.

Az úgynevezett „pohárteszt“ fontos segítség lehet a diagnosztika során: A meningococcus okozta fertőzés általában vöröses-lilás, kezdetben csak pontszerű bőrfoltok formájában, magas lázzal együtt jelentkezik. Más kiütésekkel ellentétben ezek a pontok nem tűnnek el, ha egy átlátszó pohárral erősen megnyomja őket.

Meningococcus okozta szepszis: A kiütések nem tűnnek el. Azonban NEM szabad megvárni, hogy a kiütés megjelenjen! Nem minden meningococcus okozta megbetegedésnél fordul elő, a megjelenése pedig már az előrehaladott betegség jele.

Bármilyen gyanú esetén azonnal forduljon orvoshoz!

(Fotók: © Prof. Werner Zenz)

A meningococcus okozta betegség
egy gyors lefolyású betegség

A betegség 24 órán belül halálos lehet.



Példa a meningococcus okozta fertőzés lefolyására

A meningococcus okozta betegség
halálos is lehet

Ausztriában a lehető legjobb orvosi ellátás ellenére az invazív meningococcus fertőzések **mintegy 10%-a** halálos kimenetelű.

A meningococcus okozta betegség
súlyos következményekkel járhat

A túlélők közül akár minden ötödik túlélőnél lehetnek olyan maradandó következmények, mint például az amputáció, az agykárosodás vagy a süketség.

A meningococcus okozta betegség
megelőzhető

Ne várjon! A meningococcus okozta betegség elleni lehető legjobb védelemmel kapcsolatban kérdezze meg orvosát!

Milyen védelemre van szüksége a gyermekemnek a meningococcus okozta betegséggel szemben?

Az idősebb gyermekeim is védettek a meningococcus okozta betegséggel szemben?