Розподіл менінгококів за серогрупами в Австрії, усереднене значення за 2014–2021 рр.



- Менінгококи поділяються на різні серогрупи. В Австрії найпоширеніші серотипи групи B, інфікування серотипами груп A, C, W та Y може мати тяжкий перебіг.

Чверть випадків менінгококової інфекції припадає на дітей першого року життя. Це підкреслює важливість вакцинації в ранньому дитинстві.

Існують різні вакцини, які можуть захистити від різних груп менінгококів:



- Вакцинацію для профілактики менінгококової інфекції B рекомендовано проводити всім дітям і підліткам якомога раніше, починаючи з 2-го місяця життя. Також рекомендується проводити надолужувальну вакцинацію до досягнення особою 25 років.
- Комбінована вакцинація проти менінгококових груп A, C, W та Y рекомендована немовлятам якомога раніше, на 13-му місяці життя. Вона включена до безкоштовної національної програми імунізації дітей від 10 до 13 років, оскільки на цей вік припадає другий пік захворювання. Також рекомендується проводити надолужувальну вакцинацію до досягнення особою 25 років.

Запитайте свого лікаря про найкращий захист від менінгококів!

Ця брошура доступна для завантаження кількома мовами.

Deutsch	German
Türkçe	Turkish
українська	Ukrainian
Magyar	Hungarian
Српски	Serbian
عربي	Arabic

facebook.com/MeningokokkenJAZumSchutz

instagram.com/MeningokokkenJaZumSchutz

MENINGOKOKKEN JA ZUM SCHUTZ

www.meningokokken-erkrankung.at

GlaxoSmithKline Pharma GmbH
Wienerbergstraße 7, 5. Stock
1100 Wien, Österreich

NP-AT-MNU-BROC-250007 04/2025

GSK

МЕНІНГОКОКОВІ ІНФЕКЦІЇ

ДІЙТЕ ЗАРАЗ.
ВЖИВАЙТЕ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ.

Щеплення захистить від менінгококової інфекції!

За люб'язної підтримки

ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER

ÖGKJ ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE

Що таке менінгококова інфекція?

Менінгококова інфекція є небезпечною для життя бактеріальною інфекцією, яка може мати дуже важкий перебіг. Менінгококи здебільшого спричиняють менінгіт або зараження крові (сепсис).

Бактерії живуть у носоглотці людини і можуть передаватися при поцілунку, кашлі або чханні.

Приблизно 10 % населення є носіями менінгококів. При цьому вони самі не хворіють, але можуть передавати бактерії іншим людям.

У рідкісних випадках менінгококи можуть проникати в організм і викликати інвазійне захворювання. Немовлята особливо вразливі до ризику зараження менінгококовою інфекцією через їхню незрілу імунну систему.

Менінгококова інфекція – рідкісне, але небезпечне для життя захворювання

Немовлята віком до 1 року перебувають у групі високого ризику. Немовлята та підлітки також мають підвищений ризик захворювання.

Менінгококову інфекцію важко діагностувати на початковому етапі

Менінгококову інфекцію необхідно негайно лікувати за допомогою інтенсивної терапії, оскільки вона може швидко стати небезпечною для життя. На жаль, перші симптоми, зазвичай схожі на грип, часто розпізнаються надто пізно.

Загальні симптоми

- Висока температура
- Блювота
- Сильний головний біль
- Ригідність шиї
- Чутливість до світла
- Млявість
- Червонувато-фіолетовий висип на шкірі

Звичні симптоми у немовлят: пронизливий плач, напружене або опукле тім'ячко, жорстке або мляве тіло.

Так званий тест зі склянкою може допомогти в визначенні діагнозу: Менінгококова інфекція часто проявляється червонувато-багряними, спочатку лише точковими плямами на шкірі та одночасно високою температурою. На відміну від інших висипань, ці цятки не зникають, якщо до них щільно притиснути прозору склянку.

Менінгококовий сепсис: висипання не зникають. Однак НЕ чекайте появи висипань! Вони виникають не завжди та є ознакою пізньої стадії менінгококової інфекції.

(Фото: © Prof. Werner Zenz (проф. Вернер Зенц))

За будь-яких підозр негайно звертайтеся по медичну допомогу!

Менінгококова інфекція швидко прогресує

Захворювання може призвести до летального результату протягом 24 годин.

Приблизний перебіг менінгококової інфекції

Менінгококова інфекція може бути смертельною

В Австрії, незважаючи на найкращу медичну допомогу, **близько 10 %** інвазивних менінгококових інфекцій є летальними.

Менінгококова інфекція може викликати важкі наслідки

Приблизно 1 із 5 пацієнтів, які вижили, страждає від важких наслідків, як-от ампутація кінцівок, пошкодження мозку або глухота.

Менінгококовій інфекції можна запобігти

Не зволікайте! Зверніться до свого лікаря, щоб отримати найкращий захист від менінгококів!

Що необхідно моїй дитині для захисту від менінгококової інфекції?

Чи мої старші діти також захищені від менінгококової інфекції?